

LIFTING DI BRACCIO
LA CORREZIONE DELLA LASSITA' CUTANEA DEGLI ARTI SUPERIORI

Gentilissima Paziente,

Molteplici possono essere le cause dell'eccessiva lassità della cute delle braccia: invecchiamento cutaneo, eccessiva esposizione ai raggi solari, da un difetto congenito ma molto frequentemente da repentini cali ponderali.

L'intervento:

Vengono eseguite le foto e i disegni pre-operatori per valutare la quantità di cute da rimuovere. L'intervento viene eseguito in anestesia generale con ricovero. Durante l'intervento il chirurgo, seguendo i disegni fatti, rimuove la cute ed il tessuto adiposo. Solitamente si posiziona un drenaggio che viene rimosso dopo circa 24 ore. Eseguita la sutura si applica una medicazione elasto-compressiva che dovrà essere indossata per circa un mese. Il recupero dell'attività lavorativa può essere raggiunto in due settimane, lo sport dopo circa 1-2 mesi.

Le cicatrici:

Per questo intervento la cicatrice si colloca nella faccia interna del braccio, dal gomito sino al cavo ascellare. Il chirurgo Le illustrerà con il disegno lunghezza e forma delle medesime.

Va sottolineato che il processo di cicatrizzazione è influenzato anche da fattori individuali. I fumatori cicatrizzano peggio dei non fumatori.

Consigli preoperatori:

- riferire al chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
- riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
- eseguire gli esami prescritti
- seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
- nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione da trattare mantenendola trofica ed idratata con prodotti cosmetici adeguati.
- evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
- evitare trattamenti depilatori nella settimana precedente
- evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
- evitare assunzione di superalcolico 48 h prima dell'intervento
- digiuno da 5h prima dell'intervento

Il giorno dell'intervento:

- portare gli esami prescritti
- portare i farmaci prescritti
- venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere in quanto NON è possibile guidare e comunque andare a casa senza accompagnatore.
- mangiare cibi leggeri e digeribili la sera

postoperatori:

- riposo per 24 – 48 ore, con astensione da qualunque attività fisica medio – elevata per 7-10 giorni limitare i movimenti delle braccia.
- seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
- NON rimuovere le medicazioni
- NON BAGNARE le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc...)

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it

- Per qualunque dubbio o problema contatti subito il Suo chirurgo
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dall'intervento
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo.

Alla prima medicazione Le verranno ricordati i tempi e i modi per l'eventuale trattamento con il linfodrenaggio manuale.

Serie complicanze derivanti da un intervento di Lift di Braccio sono rare. Comunque considerando l'intervento devono essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono essere: ematoma; sierosa; infezione; edema persistente; linforrea; fibrosi sottocutanea; iper- o ipopigmentazione cutanea; diastasi delle cicatrici, iper o ipo cicatrizzazione, cheloidi, alterazione della sensibilità cutanea.

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarci ai seguenti numeri telefonici :

studio 051-6494945
reperibilità 348/52.67.802

data.....

.....
firma del Paziente

.....
firma del chirurgo

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it