

## **LIFTING CERVICALE**

### **La chirurgia del ringiovanimento del collo**

L'età, l'esposizione al sole, l'effetto della gravità e lo stress della vita di tutti i giorni si manifesta anche sul collo con una perdita dei contorni, una diminuzione dell'angolo cervico mentoniero e con la formazione di festoni muscolo cutanei.

L'intervento di Lifting CERVICALE MINI INVASIVO può porre rimedio a questi inestetismi. Esso agisce rimettendo in tensione il muscolo del collo (muscolo platisma) e rimuovendo una piccola parte di cute in eccesso; è definito MINI INVASIVO in quanto, utilizzando per trazionare il muscolo platisma dei dispositivi non riassorbibili, necessità di una cicatrice ridotta. Questo intervento è spesso associato all'autoinnesto di tessuto adiposo (LIPOFILLING) nella regione centrale del viso, mento e sul contorno della mandibola per ridonare tonicità e definizione a queste regioni.

Se Lei sta pensando di eseguire un Lifting CERVICALE MINI INVASIVO questo opuscolo Le darà alcune nozioni di base per capire questa procedura.

La prego di rivolgersi al chirurgo per qualsiasi cosa non Le risulti chiara.

#### **Il chirurgo le spiegherà come tali metodiche vengono utilizzate nel Suo caso.**

Il migliore candidato per il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO è un uomo o una donna in cui vi è un rilassamento del collo e una perdita di volume e tonicità ma la cui pelle è ancora sana e discretamente elastica. La maggior parte dei Pazienti vanno dai quaranta ai sessanta anni di età ma questo intervento può essere eseguito con successo anche a settanta e ottanta anni.

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO può ridarLe un aspetto giovanile ed aumentare la Sua autostima ma non può ridonarLe salute e vitalità proprie della giovinezza. Prima di sottoporsi all'intervento pensi bene alle Sue aspettative e ne parli con il Suo chirurgo.

#### **TUTTA LA CHIRURGIA ESPONE AD INCONVENIENTI E RISCHI**

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO viene eseguito da Chirurghi qualificati e le complicanze sono rare e comunque di modesta entità. Comunque variazioni anatomiche individuali, proprie reazioni fisiche e la Sua capacità di cicatrizzazione non sono prevedibili.

Serie complicanze derivanti da un intervento di lifting facciale sono rare.

Comunque considerando l'intervento devono essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono essere: ematoma; infezione; sieroma; alterazioni

della cicatrizzazione; deficit sensitivi e motori facciali; sofferenza ischemica cutanea; fistola salivare; ipo- o iperpigmentazione cutanea; reazioni di intolleranza ai materiali impiantati.

**Una cattiva cicatrizzazione è più frequente nei fumatori.**

**Il chirurgo Le prescriverà la sospensione del fumo almeno un mese prima ed un mese dopo l'intervento.**

#### PIANIFICAZIONE DEL SUO INTERVENTO

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO è un intervento molto personalizzato; alla Sua prima visita il chirurgo valuterà il Suo stato di salute ed in particolare la Sua pressione sanguigna e la Sua eventuale tendenza a cicatrizzazioni patologiche; Lei dovrà dire al chirurgo se fuma, se assume qualche farmaco in particolare e se ha allergie .

Il chirurgo Le spiegherà quale tecnica chirurgica è più adatta per Lei basandosi sulla struttura del Suo viso, sulla Sua pelle e discuterà con Lei gli obiettivi dell'intervento. Le spiegherà il luogo dove verrà eseguito l'intervento ed il costo.

#### PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO

Le verrà consigliata una condotta particolare per quanto riguarda l'alimentazione ed il fumo.

**Il chirurgo le prescriverà la sospensione del fumo almeno un mese prima ed un mese dopo l'intervento.**

Le verrà consigliato il digiuno dalla mezzanotte precedente l'intervento e potrà essere consigliata la sospensione e la somministrazione di alcuni farmaci.

E' di particolare importanza sospendere il fumo almeno due settimane prima dell'intervento; il fumo riduce la circolazione sanguigna nella pelle e quindi può interferire sulla cicatrizzazione .

Inoltre le verrà consigliato di farsi venire a prendere alla clinica il giorno della dimissione e di avere qualcuno di aiuto per alcuni giorni dopo l'intervento, se necessario.

#### LUOGO DELL'INTERVENTO

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO viene eseguito in clinica in regime di DH o con ricovero di almeno di 24 ore a seconda della valutazione del chirurgo

#### TIPO DI ANESTESIA

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO viene eseguito in anestesia generale o locale con sedazione.

## L'INTERVENTO

Il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO solitamente richiede alcune ore di intervento (2-3ore).

L'esatto posizionamento delle incisioni e la procedura dipendono dalla struttura del Suo viso e dalla tecnica del chirurgo.

Solitamente l'incisione parte sotto il lobo auricolare e risale dietro sino a nascondersi lungo la linea di attaccatura dei capelli sul collo; se è necessario un particolare lavoro sul collo potrà esserci una piccola cicatrice sotto il mento.

Solitamente la pelle viene separata dai muscoli sottostanti e questi ultimi vengono rimessi in tensione con utilizzando dei dispositivi riassorbibili; la pelle viene leggermente messa in tensione asportando l'eventuale eccesso solo nel collo.

Per quanto riguarda il lipofilling vengono eseguiti solo piccoli fori sulla pelle nelle zone di prelievo del tessuto adiposo e nel viso per l'impianto. Solitamente non sono necessari punti di sutura. Il 30-40% delle cellule adipose che vengono impiantate sopravvivranno ad un anno di distanza.

Al termine dell'intervento viene posizionato sotto pelle un piccolo tubino di gomma per ogni lato (drenaggio) per drenare eventuali piccole quantità di sangue. Verrà quindi messa un'ampia medicazione sul viso.

## DOPO L'INTERVENTO

Le verranno prescritti farmaci per i fastidi postoperatori che comunque non saranno rilevanti.

Per qualsiasi fastidio o condizione particolare non esiti a contattare il Suo chirurgo. Lividi e gonfiori sono normali e scompariranno in poche settimane. I drenaggi sono solitamente rimossi uno o due giorni dopo. L'ampia medicazione viene solitamente rimossa dopo quattro cinque giorni; non preoccupatevi in quell'occasione di vederVi gonfiori e lividi, il Vostro aspetto tornerà normale in alcune settimane.

I punti verranno rimossi tra il VII ed il XV giorno postoperatorio.

## RITORNO ALLA NORMALITÀ'

Sarà in piedi già il primo giorno ma si conceda riposo assoluto per almeno la prima settimana. Sia particolarmente dolce con la Sua pelle.

Il chirurgo Le fornirà i modi ed i tempi per il Suo ritorno all'attività lavorativa (solitamente dopo dieci o quindici giorni).

Eviti comunque attività faticose (incluso sesso e lavori domestici pesanti) per almeno due settimane; eviti alcool, bagni caldi e saune per alcune settimane; limiti le esposizioni solari delle cicatrici per alcuni mesi.

*Studio Gennai*  
*Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –*  
*Tel. +39-051-6494945*  
*e. mail [info@gennaichirurgia.it](mailto:info@gennaichirurgia.it)*

Il Suo viso Le apparirà strano anche per la presenza di segni dell'intervento; il Suo aspetto comincerà a migliorare già dalla II settimana. Le cicatrici rimarranno arrossate per 4-8 settimane, anche se la completa consolidazione avverrà dopo 6 mesi - 1 anno.

Fare un LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO non significa fermare il tempo ma la Sua pelle continuerà la sua evoluzione fisiologica; il LIFTING CERVICALE MINI INVASIVO può essere ripetuto più volte nell'arco della vita. Nello stesso tempo il risultato è definitivo in quanto con il passare del tempo il Suo aspetto sarà sempre più giovanile rispetto alla Sua età

**CONDOTTA DA ESEGUIRE DOPO L'INTERVENTO:**

- Riposo per 24-48 ore, con astensione da qualunque attività fisica
- Eseguire scrupolosamente la terapia farmacologia e comportamentale prescritta
- Non rimuovere le medicazioni
- NON BAGNARE le medicazioni ( no doccia, bagno, piscina ecc...)
- Per qualunque dubbio o problema contatti subito il Suo chirurgo
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dall'intervento
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni)

studio 051-6494945  
reperibilità 348/52.67.802

data.....

.....

firma del Paziente

dottor Alessandro Gennai .....  
firma del chirurgo