

**LIFTING ENDOSCOPICO TEMPORO
FRONTALE E PERIOCLARE
M.I.V.E.L.
MINIMAL INCISIONS VERTICAL ENDOSCOPIC LIFTING**

Il Lifting Endoscopico del viso è un intervento per il ringiovanimento dei 2/3 superiori del viso. Tale intervento, riducendo le rughe, sollevando il sopracciglio e la regione delle guance e zigomo eliminando quell'espressione triste e stanca conferendo un aspetto più rilassato, fresco e giovanile.

CONSIDERAZIONI SUL LIFTING ENDOSCOPICO DEL VISO

Questo intervento spesso è eseguito per trattare le condizioni associate all'invecchiamento. Può essere eseguito in associazione con altri interventi di ringiovanimento per ottenere un'armoniosa apparenza del volto.

Il lifting endoscopico del viso può estendersi a 2 livelli:

1. ***Lifting tempo-frontale e perioculare:*** quando la zona da correggere oltre alle precedenti è anche la zona perioculare.

Le migliori candidate sono le Pazienti che presentano:

- Basso posizionamento del sopracciglio
- Rughe alla radice del naso
- Rughe orizzontali profonde della fronte
- Rughe pericolavi
- Abbassamento angolo laterale dell'occhio
-

2. ***Lifting temporo-fronto-perioculare-malare:*** questo intervento si esegue quando oltre al ringiovanimento del terzo superiore del viso si vuole correggere anche il terzo medio ovvero quella zona che va dallo zigomo alla commessura labiale.

Le migliori candidate sono le Pazienti che oltre a segni di invecchiamento del III superiore del viso presentano una:

- Rilassamento delle guance
- Diminuzione delle prominenze degli zigomi

In questo intervento a volte vengono posizionate delle suture interne NON riassorbibili (endosuture) e dispositivi di sospensione (endotine) riassorbibili nell'arco dell'anno per mantenere l'effetto dell'intervento più stabile nel tempo.

Sarà il Suo chirurgo in base alla Sua situazione ed alle Sue esigenze che sceglierà quale di queste tre procedure è più indicata per Lei.

Può essere eseguito in contemporanea ad altre procedure chirurgiche come ad esempio lifting cervicofacciale, blefaroplastica superiore ed inferiore, trattamento con radiofrequenza e laser, lipofilling, SEFFI e microliposcultura del viso; il Suo Chirurgo Plastico Le potrà fornire ulteriori informazioni riguardo questi interventi.

LA SUA VISITA DAL CHIRURGO PLASTICO

Durante la visita il Suo Chirurgo Plastico Le chiederà di guardarsi alla specchio e di indicargli esattamente cosa Lei vorrebbe vedere migliorato. Qualche volta i pazienti focalizzano la loro attenzione sull'eccesso cutaneo presente sulla palpebra superiore e non realizzano che l'abbassamento (ptosi) del sopracciglio contribuisce all'eccesso cutaneo della palpebra superiore.

Lei dovrà essere molto sincera nell'esporre ciò che non gradisce del Suo aspetto, come anche esternare quali sono le Sue speranze di miglioramento con questo tipo di intervento chirurgico.

Ciò aiuta il Suo Chirurgo a capire quali siano le Sue aspettative e determinare se esse possano realisticamente essere ottenute con la chirurgia e scegliere quale procedura è più indicata per Lei.

VALUTAZIONE CHIRURGICA PER LIFTING ENDOSCOPICO DEL VISO

Lei dovrà fornire al medico tutte le informazioni provanti le Sue condizioni fisiche e se ha già eseguito interventi chirurgici alle palpebre o facciali e se assume farmaci in particolare antiipertensivi, anticoagulanti, antiinfiammatori e pillola anticoncezionale. Tutto ciò è importante per avere una completa informazione sul Suo stato di salute.

Ci sono vari metodi per sollevare il sopracciglio e correggere l'invecchiamento della regione frontale. Il Suo Chirurgo Plastico esaminerà attentamente tutta la regione frontale e la porzione della palpebra superiore valutando attività muscolare quando Lei assume varie espressioni del volto. La particolare tecnica chirurgica che il Chirurgo Le raccomanderà dipende da molti fattori, come la qualità della cute, la posizione delle sopracciglia, l'entità dell'eccesso cutaneo della palpebra superiore e l'altezza della Sua linea dei capelli. E' importante riferire al proprio Chirurgo precedenti impianti di materiale o interventi al viso.

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it

COME VIENE ESEGUITO IL LIFTING ENDOSCOPICO TEMPORO-FRONTALE E PERIOCULARE

A causa di fattori variabili individuali non tutti ottengono lo stesso risultato da tale intervento.

L'intervento prevede 5 incisioni di 1-2 cm dietro l'attaccatura dei capelli nella zona frontale ed 1 incisione (per lato) di circa 2-3 cm dietro l'attaccatura dei capelli nella zona temporale.

A seconda dei casi l'intervento può essere eseguito in anestesia generale oppure in anestesia locale assistita, con ricovero in clinica o in regime di Day Hospital.

Tali incisioni non saranno visibili una volta consolidate. Attraverso tali incisioni il Suo Chirurgo Plastico per via endoscopica può modificare o rimuovere parte del muscolo che causa le rughe frontali glabellari e periorculari e innalzare il sopracciglio ad un livello più piacevole.

Questa tecnica endoscopica ha il vantaggio di essere meno traumatica richiedendo minime incisioni del cuoio capelluto, nessun taglio di capelli e nessuna asportazione cutanea e quindi prevede un rapido recupero dell'attività lavorativa e sociale.

RISCHI E COMPLICANZE

Serie complicanze derivanti da questo intervento sono rare. Ogni anno migliaia di persone si sottopongono a questo tipo di intervento chirurgico con buoni risultati e un notevole miglioramento del proprio aspetto. Comunque considerando l'intervento devono essere presi in considerazione i rischi e i benefici. E' consigliabile discutere direttamente con il Suo Chirurgo dei rischi e potenziali complicanze derivanti da tale intervento chirurgico. Alcuni delle potenziali complicanze includono:

- l'ematoma (che è un accumulo di sangue sotto la cute che può richiedere il drenaggio)
- l'infezione
- parestesie (alterazione della sensibilità che si manifesta come se la regione fosse ancora anestetizzata) tale complicanza è in molti casi transitoria ma in rari casi può essere permanente
- alopecia (modesta perdita di capelli a livello delle incisioni del cuoio capelluto solitamente temporanea e di veloce scomparsa)
- sieroma
- gonfiore persistente
- Paresi (alterazioni della mobilità di alcuni muscoli) tale complicanza è in molti casi transitoria ma in rari casi può essere permanente
- Asimmetrie (molto frequentemente tali asimmetrie sono pre-esistenti all'intervento ma il Paziente le focalizza solo guardandosi successivamente. A volte invece tali asimmetrie si manifestano come conseguenze dell'intervento. Tale complicanza si risolve spontaneamente in alcuni mesi.

Nel Lifting endoscopico tempo-fronto-periorculari e malare quando si posizionano le suture interne riassorbibili (endosuture) può in rari casi verificarsi:

- Intolleranza al filo
- Superficializzazione del filo

*Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it*

- Fovea cutanea (depressione) nelle zone di ancoraggio, tale problema solitamente si risolve in 30-60 giorni.

In caso di utilizzo di dispositivi di sospensione tipo endotine si possono verificare:

- Intolleranza
- Irregolarità cutanea
- dislocamento

Lei può minimizzare i rischi e le eventuali complicanze seguendo le istruzioni del Suo Chirurgo Plastico sia prima che dopo il Suo intervento chirurgico.

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO

Se Lei è una fumatrice o un fumatore le verrà chiesto dal Suo Chirurgo di sospendere o almeno ridurre il fumo prima dell'intervento. E' importante riferire al Chirurgo l'eventuale terapia in atto, l'assunzione di aspirina® o di alcuni farmaci antinfiammatori, che possono (alcuni dei quali) causare un aumento del sanguinamento. Il Suo Chirurgo deciderà se sospendere tali farmaci prima dell'intervento chirurgico, inoltre il Suo Chirurgo le fornirà addizionali istruzioni pre-operatorie. Dopo l'intervento chirurgico, al momento della dimissione è bene che una persona l'accompagni a casa e rimanga con Lei la notte successiva l'intervento.

Dopo l'intervento è presente una medicazione intorno alla testa e sulla fronte per ridurre il gonfiore; a volte un piccolo tubo di drenaggio può essere posizionato sotto il cuoio capelluto per drenare i liquidi.

DOPO L'INTERVENTO

Per alcune sere dopo l'intervento chirurgico Lei dovrebbe riposare con il capo sollevato. Inizialmente potrebbe avvertire un modesto dolore o fastidio che può essere facilmente controllato con farmaci assunti per via orale; ricordi che è meglio non assumere aspirina o farmaci antinfiammatori e che non deve fumare o essere esposta a fumo passivo subito dopo l'intervento chirurgico. Sarà presente un temporaneo gonfiore e colorazione livida che può coinvolgere le palpebre e l'area delle guance. Tipicamente il gonfiore sarà completamente risolto nel giro di due settimane. Può usare un trucco coprente quasi immediatamente, deve solo fare attenzione a non usare il prodotto direttamente sui punti di sutura.

La medicazione deve essere tenuta per almeno 4-5 giorni.

La doccia e lo shampoo può essere fatto dopo circa 7 giorni; i punti di sutura saranno rimossi dopo circa 2 settimane dall'intervento.

Deve evitare di fare sforzi fisici come: alzarsi, chinarsi durante la prima settimana post-operatorio. In molti casi lei sarà abile ad eseguire le normali attività quotidiane nel giro di 10 giorni. Dovrebbe

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it

temporaneamente evitare di esporsi ai raggi solari e per un periodo più prolungato, almeno 30 giorni, usare una crema solare protettiva.

Il processo di guarigione è lento e graduale quindi lei deve aspettare parecchie settimane (8-12) prima di avere il risultato definitivo

MANTENERE IL CONTATTO CON IL SUO CHIRURGO PLASTICO

Lei tornerà dal suo chirurgo plastico per controlli e medicazioni ad intervalli prescritti e durante questi controlli saranno valutati i suoi progressi .

Una volta completato l'immediato periodo post-operatorio il Suo Chirurgo La incoraggerà e Le consiglierà di tornare per periodici controlli e per osservare e discutere il risultato dell'intervento chirurgico a lunga distanza dall'intervento e ricordi inoltre che il rapporto con il Suo Chirurgo Plastico non finisce quando lei lascia la sala operatoria. Se Lei ha dei dubbi o delle domande durante il ricovero in clinica o se ha bisogno di informazioni addizionali dopo l'intervento è pregata di contattare il Suo Chirurgo Plastico.

CONDOTTA DA ESEGUIRE DOPO LA DIMISSIONE

- Riposo per 24-48 ore, con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata; (no immobilizzazione a letto)
- Eseguire scrupolosamente la terapia farmacologia e comportamentale prescritta;
- Non rimuovere le medicazioni;
- NON BAGNARE le medicazioni (no doccia, bagno, piscina);
- Per qualunque dubbio o problema contatti subito il suo chirurgo;
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dall'intervento;
- Evitare esposizione ad alte temperature (sauna, bagnoturco)
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni)

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri telefonici :

studio 051-6494945
reperibilità 348/52.67.802

data.....

..... firma del Paziente

Dottor Alessandro Gennai..... firma del Chirurgo

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it