

MASTOPLASTICA ADDITIVA

secondaria

Gentilissima Paziente,

L'aumento del seno o mastoplastica additiva è una procedura chirurgica che ha lo scopo di aumentare il volume del seno: è pertanto tipicamente eseguita su seni iposviluppati (piccoli) o diminuiti di volume in seguito a dimagramenti o gravidanze. Si esegue infine per bilanciare una asimmetria mammaria. A volte si rende necessario intervenire di nuovo su un seno che ha già subito un aumento con protesi per vari motivi:

- necessità di sostituire vecchie protesi
- presenza di contrattura capsulare (indurimento del seno)
- desiderio di modificare volume o modello protesico
- riposizionamento della protesi per precedente asportazione a causa di : infezione, fenomeni di intolleranza, sieromi etc. In tal caso è necessario attendere alcuni mesi prima di riposizionare la protesi.

PROCEDURA CHIRURGICA

L'intervento chirurgico consiste nell'inserimento di una protesi mammaria sopra o sotto il muscolo pettorale a seconda della situazione preesistente e del tipo di problematica che ha richiesto la sostituzione della protesi

La via di approccio chirurgico è generalmente la stessa utilizzata per il precedente intervento ovvero da una incisione praticata nel solco sottomammario oppure a livello periareolare inferiore o in sede ascellare a livello del pilastro muscolo pettorale. In alcuni casi può rendersi necessaria una regolarizzazione del profilo mammario con tessuto adiposo autologo (lipofilling).

Le protesi mammarie attualmente a disposizione del chirurgo sono preriempite con gel di silicone oppure gonfiabili con soluzione fisiologica; la superficie esterna può essere liscia o rugosa; la forma può essere tonda o a profilo anatomico.

Una piccola sutura chiuderà l'incisione cutanea. Potrebbe essere necessario posizionare due piccoli drenaggi che saranno rimossi dopo 24-48 ore dall'intervento; sarà eseguita una medicazione compressiva e verrà applicato un reggiseno particolare.

Le complicanze derivanti da un intervento di mastoplastica additiva secondaria sono statisticamente maggiori rispetto a quelle di un intervento primario di mastoplastica additiva e consistono in : ematoma; sieroma; infezione; contrattura capsulare; intolleranza alla protesi; dislocamento e rotazione della protesi; alterazioni della protesi (rottura, deterioramento,

sgonfiamento, etc.); irregolarità cutanee (wrinkles); alterazioni della cicatrizzazione; alterazioni della sensibilità complesso areola-capezzolo.

In alcuni pazienti si può riscontrare, a distanza di tempo dall'intervento, la presenza di un accumulo di liquido intorno alla protesi. Nonostante molti di questi casi siano di natura essenzialmente post-traumatica, è importante che questi pazienti vengano studiati accuratamente, in quanto recentemente è stata definita una patologia denominata ALCL (Linfoma anaplastico a grandi cellule) che può presentarsi in rari casi di pazienti portatrici di un certo tipo di protesi mammarie. Attualmente, a fronte di milioni di protesi impiantate, il numero di casi di questa patologia appare molto limitato. La maggior parte di queste pazienti guarisce attraverso l'asportazione delle protesi e delle capsule cicatriziali intorno ad esse. In rarissimi casi è stata riscontrata una più grave malattia metastatica.

Nel caso di intervento secondario dovuto ad una precedente rimozione di una protesi per problemi inerenti a infezioni, intolleranza o severa contrattura capsulare, tale complicanza può ripresentarsi con una notevole frequenza (20-50%) a prescindere dalla tecnica utilizzata e dai tipo di protesi utilizzato.

FASE POST-OPERATORIA

La medicazione viene rimossa dopo circa 7 giorni e le suture dopo 14-21 giorni circa. Il risultato è subito apprezzabile, ma dovrà trascorrere circa un mese perché scompaiano definitivamente lividi e gonfiori.

Una eventuale successiva gravidanza non modificherà, se non in maniera fisiologica, la forma del seno e non vi è alcuna preclusione all'allattamento. La presenza della protesi non altera eventuali esami radiologici

CONSIGLI PRE-OPERATORI:

- riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
- riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
- eseguire gli esami prescritti
- seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
- nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione mammaria mantenendola trofica ed idratata con prodotti cosmetici adeguati.
- evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
- evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
- evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
- digiuno da 10 ore prima dell'intervento

IL GIORNO DELL'INTERVENTO:

- portare gli esami prescritti
- portare i farmaci prescritti e il reggiseno consigliato
- venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere, al momento della dimissione, in quanto NON è possibile guidare e comunque andare a casa senza accompagnatore.

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it

- mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima dell'intervento

Firma del paziente.....

CONSIGLI POST-OPERATORI:

- evitare sforzi con le braccia per almeno 15gg
- evitare di sollevare le braccia al di sopra delle spalle per 7gg
- riposo assoluto per 24 – 48 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
- seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
- NON rimuovere le medicazioni
- NON bagnare le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc...)
- Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo chirurgo
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dopo l'intervento.
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni)

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri telefonici :

Studio: 051 64.94.94.5

Reperibilità: 348 52 67 802

data.....

.....
firma del paziente

dottor Alessandro Gennai.....

firma del chirurgo

Studio Gennai
Via Lame, 98-40122 – BOLOGNA –
Tel. +39-051-6494945
e. mail info@gennaichirurgia.it